

Zó voer je Colon

Dieetvoeding is afgestemd op het paard en op de situatie. Uw dierenarts controleert uw paard en geeft u een uitgebreid voeradvies, waarbij hij of zij ook het ruwvoer meeneemt en de tijden van voeren. De dierenarts is uw aanspreekpunt en vraagbaak als u uw paard of de voeding niet vertrouwt.

Uw paard of pony: Gewicht¹:
 Begeleidend dierenarts:
 Volgende afspraak:

¹ *Gewicht van het paard: het ideale gewicht van uw paard/pony kan afwijken van het huidige gewicht, maar is wel het uitgangspunt voor het voerschema.*

Rantsoen (datum:)

	Bonpard Colon	Hooi (1)	Kuilvoer (2)	Weidegang (3)
Uw paard/pony:	kg	kg	kg	uur

Voer dagelijks minimaal 4 porties hooi en 2 porties Bonpard Colon (Bonpard Colon en hooi mag tegelijk). Zorg dat uw dier nooit langer dan 6 uur geen eten heeft.

Rekenwijzer rantsoensamenstelling met hooi (basis):

Kijk in welke categorie uw paard of pony valt en bereken de dagelijkse voergift. Zie de omrekeningstabel, als u in plaats van hooi, kuilvoer of gras wil voeren.

Gewicht paard	Werkniveau ²	Per 100 kg lichaamsgewicht		Uw paard/pony:	
		Bonpard Colon	Grofstengelig-fris hooi	Bonpard Colon	Hooi
< 250 kg	rust	480 g	1,3 kg		
	licht	500 g	1,7 kg		
	matig	600 g	1,9 kg		
	zwaar	700 g	2,0 kg		
250-450 kg	rust	400 g	1,2 kg		
	licht	500 g	1,5 kg		
	matig	550 g	1,7 kg		
	zwaar	600 g	1,7 kg		
	zeer zwaar	900 g	2,0 kg		
> 450 kg	rust	350 g	1,1 kg		
	licht	450 g	1,4 kg		
	matig	500 g	1,5 kg		
	zwaar	550 g	1,6 kg		
	zeer zwaar	750 g	2,0 kg		

² *Schat het gemiddelde werkniveau per week, dus inclusief rustdagen!*

Disclaimer: Afwijkingen van het voeradvies kunnen de positieve werking teniet doen.

Gras of kuilvoer:

Begin altijd met een rantsoen met hooi, dus geen kuilvoer of gras. Als de klachten duidelijk verbeterd zijn, mag u gras of kuilvoer voorzichtig in het rantsoen introduceren, uitgewisseld tegen hooi (zie omrekeningstabel). Het ruwvoer van paarden met verstoring van de darmflora, chronische hoefbevangenheid en/of insuline resistentie moet altijd voor minimaal 50% uit hooi bestaan (op droge stofbasis). Alleen voor paarden met maagzweren mag het ruwvoer voor 100% uit gras bestaan.

Hoeveel kg kuilvoer vervangt 1 kg hooi?:

Drogestofgehalte kuilvoer:	60%	70%	75%
	<i>behoorlijk natte paardenkuilvoer</i>	<i>paardenkuilvoer</i>	<i>droge paardenkuilvoer</i>
1 kg hooi wordt:	1,4 kg kuilvoer	1,2 kg kuilvoer	1,1 kg kuilvoer

Omrekeningstabel vervanging hooi door gras (weidegang):

	1 uur weidegang		2 uur weidegang		3 uur weidegang	
	rust	werk	rust	werk	rust	werk
Kleine pony	45%	35%	–	–	–	–
Grote pony	30%	25%	–	50%	–	–
Paard	20%	15%	40%	30%	–	50%

Overgangsschema huidig voer naar Bonpard Colon:

	Huidig rantsoen	Week 1	Week 2	Week 3 (Nieuw rantsoen)
Huidig krachtvoer	kg	60%: kg	30%: kg	–
Huidig ruwvoer (<i>indien anders dan in het nieuwe rantsoen</i>)	kg	60%: kg	30%: kg	–
.....	kg	60%: kg	30%: kg	–
Bonpard Colon	–	30%: kg	60%: kg	100%:
Grofstengelig en fris hooi	–	30%: kg	60%: kg	100%:

Extra informatie:

- Geef uw paard een zoutblok in zijn stal.
- Voer geen supplementen of toevoegingen, tenzij op voorschrift van uw dierenarts.
- Weeg Bonpard in een voerschep op een huishoudweegschaal. Markeer op de voerschep de hoeveelheid van één portie.
- Juiste hoeveelheden voeren is belangrijk dus weeg elke 3 maanden hooi op een personenweegschaal of met een unster (in een hooinet). Doe dit ook bij: begin stalseizoen, elke nieuwe partij hooi, nieuwe voerder.
- Controleer bij ontvangst de verpakking op beschadigingen. **Houdbaarheid:** tot 6 maanden na productiedatum (zie verpakking). **Bewaarcondities:** koel en droog.