

# Zó voer je Non-obesitas

Dieetvoeding is maatwerk. Uw dierenarts controleert uw paard en geeft u een uitgebreid advies. Waarbij hij of zij ook het ruwvoer meeneemt en de tijden van voeren. De dierenarts is uw aanspreekpunt en vraagbaak als u uw paard of de voeding niet vertrouwt.

Uw paard of pony: ..... Huidig gewicht: .....  
Begeleidend dierenarts: ..... Body Condition Score: .....  
Volgende afspraak: ..... Streefgewicht: .....

## Rantsoen (datum: .....)

	Bonpard Non-obesitas	Hooi	Stro
Uw paard/pony: .....	..... kg	..... kg	..... kg

## Rekenwijzer rantsoensamenstelling Bonpard Non-obesitas:

U gebruikt het streefgewicht om het rantsoen uit te rekenen.

## Paarden die $\pm 1$ uur training per dag krijgen

Streefgewicht	Per 100 kg lichaamsgewicht	
	Bonpard Non-obesitas	Grofstengelig hooi
100-150 kg	500 g	1,40 kg
150-300 kg	460 g	1,30 kg
300-450 kg	420 g	1,10 kg
450-600 kg	365 g	1,10 kg
600-800 kg	345 g	1,00 kg

## Paarden die geen training krijgen (bijv. wegens lichamelijke problemen)

Streefgewicht	Per 100 kg lichaamsgewicht		
	Bonpard Non-obesitas	Grofstengelig hooi	Stro
100-200 kg	440 g	1,00 kg	100 g
200-350 kg	400 g	0,75 kg	200 g
350-500 kg	350 g	0,70 kg	200 g
500-800 kg	300 g	0,70 kg	200 g

## Ruwvoer:

Gras is té energierijk en past niet in een vermageringsprogramma. Weidegang kan weer als het paard op het gewenste gewicht is. Als u wat hooi in een uitloop of paddock voert, kan het paard toch buiten lopen. Het meeste kuilvoer past ook niet in een vermageringsdieet omdat het te rijk is en u er dus te weinig van mag voeren. Een Bonpard Non-obesitas vermageringsdieet bevat energiearm ruwvoer, zodat het paard voldoende vezels opneemt en lang genoeg kauwt. Grofstengelig hard hooi heeft de voorkeur. Een vergelijkbare (energie arme) kwaliteit kuilvoer kan als alternatief dienen.

## Overgangsschema huidig voer naar Bonpard Non-obesitas:

	Huidig rantsoen	Week 1	Week 2	Week 3 (nieuw rantsoen)
Huidig krachtvoer .....	..... kg	60%: ..... kg	30%: ..... kg	–
Huidig ruwvoer (indien anders dan in het nieuwe rantsoen) .....	..... kg	60%: ..... kg	30%: ..... kg	–
Bonpard Non-obesitas .....	–	30%: ..... kg	60%: ..... kg	100%: ..... kg
Grofstengelig fris hooi .....	–	30%: ..... kg	60%: ..... kg	100%: ..... kg
Stro .....	–	30%: ..... kg	60%: ..... kg	100%: ..... kg

## Extra informatie:

### Voeren:

- Voer dagelijks minimaal 4 porties hooi en 2 porties Bonpard Non-obesitas (Bonpard Non-obesitas en hooi mag tegelijk). Zorg dat uw dier nooit langer dan 6 uur geen eten heeft.
- Weeg hooi en stro met een unster of een personenweegschaal.
- Markeer op een voerschip de juiste hoeveelheid Bonpard Non-obesitas.

### Training, beweging en afleiding:

- Training en beweging versnellen het verbruik van de vetreserves. Zij gaan bovendien verveling tegen en helpen zo bij de preventie van stalondeugden, zoals weven en kribbebijten.
- Geef het paard zoveel mogelijk afleiding om verveling tegen te gaan: borstelen, wandelen, gezelschap (pony, geit), ...

### Tijdsduur en begeleiding:

- Laat de dierenarts elke 4 tot 6 weken het paard en het voer controleren, om vast te stellen of het voerschema (dieet) het juiste effect heeft.
- De tijd die nodig is om het streefgewicht te bereiken is meestal minimaal 3 maanden en hangt af van de body condition score en het lichaamsgewicht bij aanvang.

Controleer bij ontvangst de verpakking op beschadigingen. **Houdbaarheid:** tot 6 maanden na productie-datum (zie verpakking). **Bewaarcondities:** koel en droog.

**Disclaimer:** Afwijkingen van het voeradvies kunnen de positieve werking teniet doen.