

BONPARD® MOTILITY

Aanvullend dieetvoeder voor paarden ter compensatie van chronische insufficiëntie van de dunne darm.

Bij terugkerende verstoppingskoliek en harde mest. Een chronische insufficiëntie van de dunne darm kan leiden tot een trage doorstromingsnelheid van het voer in de darmen, met als gevolg koliek door verstoppingen en te harde mest. **Bonpard Motility** is speciaal samengesteld om een vlotte passage en goede verteerbaarheid in de dunne darm te stimuleren. Speciaal geselecteerde vezels bevorderen de darmbewegingen en versnellen de fermentatie. Dit zorgt voor een goede doorstroming van voer en voorkomt verstoppingen. Daarbij heeft **Bonpard Motility** een hoge waterbindingscapaciteit, zodat de darminhoud minder snel indroogt en vastloopt.


Voor beter functioneren van de darmen. De ingrediënten in **Bonpard Motility** zijn voorbehandeld (ontsloten) zodat enzymen in de dunne darm ze beter en sneller afbreken. Als de dunne darm het overgrote deel van het rantsoen verteert, blijft er weinig voer over om een verstopping te veroorzaken in de dikke darm. De zemelen in **Bonpard Motility** stimuleren de darmbewegingen en daarmee ook de vermenging van het voer met verteringsenzymen. De levende gistcellen bevorderen de afbraak van vezels in de blinde en de dikke darm. In combinatie met zacht, fijn hooi vormt **Bonpard Motility** een compleet rantsoen dat goed en snel verteert.

Het begint met een diagnose. Koliek kan vele oorzaken hebben. Uw dierenarts kan het beste beoordelen wat de oorzaak van de gezondheidsklachten van een paard zijn, om vervolgens te bepalen welke behandeling en welke voedingsaanpassingen het beste zijn.

Bij veel paarden zal een langdurige dieetvoeding noodzakelijk zijn, soms zelfs levenslang. De aanbevolen gebruiksduur is aanvankelijk ten hoogste 6 maanden. Aangeraden wordt om voor gebruik of voor verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. Alle Bonpard dieetvoerders zijn geschikt voor levenslang gebruik.

Bonpard paardenvoeders zijn alleen verkrijgbaar bij de dierenarts.

BONPARD® MOTILITY



Bonpard Motility is geschikt bij koliek door verstoppingen, onvoldoende darmbewegingen en trage darmpassage. Het stimuleert een goede vertering en een vlotte passage in het gehele darmstelsel. Dit ondersteunt de preventie van verstoppingskoliek.

Kenmerken:

- voorbehandelde (ontsloten) grondstoffen
- optimale verteerbaarheid
- hoog gehalte speciaal geselecteerde vezels
- bevat levende gistcellen

Zó voer je Motility

Dieetvoeding is afgestemd op het paard en op de situatie. Uw dierenarts controleert uw paard en geeft u een uitgebreid voeradvies, waarbij hij of zij ook het ruwvoer meeneemt en de tijden van voeren. De dierenarts is uw aanspreekpunt en vraagbaak als u uw paard of de voeding niet vertrouwt.

Uw paard of pony: Gewicht¹:

Begeleidend dierenarts:

Volgende afspraak:

¹ *Gewicht van het paard: het ideale gewicht van uw paard/pony kan afwijken van het huidige gewicht, maar is wel het uitgangspunt voor het voerschema.*

Rantsoen (datum:)

Bonpard Motility	Hooi (1)	Kuilvoer (2)	Weidegang (3)
Uw paard/pony: kg kg kg uur

Voer dagelijkse minimaal 4 porties hooi en 2 porties Bonpard Motility (Bonpard en hooi mag tegelijk). Zorg dat het paard nooit langer dan 6 uur geen eten heeft.

Rekenwijzer rantsoensamenstelling met hooi (basis):

Kijk in welke categorie uw paard of pony valt en bereken de dagelijkse voergift. Zie omrekeningstabel, als u in plaats van hooi, kuilvoer of gras wil voeren.

Gewicht paard	Werkniveau ²	Per 100 kg lichaamsgewicht		Uw paard/pony:	
		Bonpard Motility	Fijn-zacht-fris hooi	Bonpard Motility	Hooi
< 250 kg	rust	550 g	1,1 kg
	licht	650 g	1,2 kg		
	matig	750 g	1,4 kg		
	zwaar	800 g	1,5 kg		
250-450 kg	rust	450 g	1,0 kg
	licht	600 g	1,3 kg		
	matig	650 g	1,4 kg		
	zwaar	700 g	1,4 kg		
	zeer zwaar	1000 g	1,8 kg		
> 450 kg	rust	400 g	0,9 kg
	licht	500 g	1,1 kg		
	matig	550 g	1,2 kg		
	zwaar	650 g	1,3 kg		
	zeer zwaar	900 g	1,8 kg		

² *Schat het gemiddelde werkniveau per week, dus inclusief rustdagen!*

Hoeveel kg kuilvoer vervangt 1 kg hooi?:

Drogestof gehalte kuilvoer:	60%	70%	75%
	behoorlijk natte paardenkuilvoer	paardenkuilvoer	droge paardenkuilvoer
1 kg hooi wordt:	1,4 kg kuilvoer	1,2 kg kuilvoer	1,1 kg kuilvoer

Omrekeningstabel vervanging hooi door gras (weidegang):

Gras versnelt de fermentatie en mag het hooi vervangen.

	1 uur	2 uur	3 uur	4 uur	5 uur	6 uur
Paard op rust of grote pony die werkt	25%	50%	75%	95%	-	-
Paard dat werkt	20%	35%	55%	70%	90%	100%
Grote pony op rust of kleine pony die werkt	35%	65%	90%	-	-	-
Kleine pony op rust	45%	90%	-	-	-	-

Overgangsschema huidig voer naar Bonpard Motility:

	Huidig rantsoen	Week 1	Week 2	Week 3 (Nieuw rantsoen)
Huidig krachtvoer kg	60%: kg	30%: kg	-
Huidig ruwvoer (indien anders dan in het nieuwe rantsoen) kg	60%: kg	30%: kg	-
..... kg	60%: kg	30%: kg kg	-
..... kg	60%: kg	30%: kg kg	-
Bonpard Motility	-	30%: kg	60%: kg	100%:
Fijn, zacht hooi	-	30%: kg	60%: kg	100%:

Extra informatie:

- Bij veel paarden zal een langdurige dieetvoeding noodzakelijk zijn, soms zelfs levenslang. Alle Bonpard voeders zijn volledig geschikt voor levenslang gebruik.
- Geef uw paard een zoutblok in zijn stal.
- Voer geen supplementen of toevoegingen, tenzij op voorschrift van uw dierenarts.
- Weeg Bonpard in een voerschip op een huishoudweegschaal. Markeer op de voerschip de hoeveelheid van één portie.
- Juiste hoeveelheden voeren is belangrijk dus weeg elke 3 maanden hooi op een personenweegschaal of met een unster (in een hooinet). Doe dit ook bij: begin stalseizoen, elke nieuwe partij hooi, nieuwe voerder.
- Controleer bij ontvangst de verpakking op beschadigingen. **Houdbaarheid:** zie verpakking. **Bewaarcondities:** koel en droog.

Disclaimer: Afwijkingen van het voeradvies kunnen de positieve werking teniet doen.