

# Bonpard® Colostrum

NL

## Aanvullend diervoeder voor veulens en paarden

**Zuiver gevriesdroogde bovine colostrumpoeder (95%), ook wel bekend als biest, met prebiotica ter ondersteuning van de weerstand en darmflora van pasgeboren veulens en paarden.**

**Netto gewicht: 450 g**

**Bewaaraadvies:** 24 maanden na de productiedatum, mits bewaard onder de aanbevolen bewaaromstandigheden. Op een droge plaats (<25°C) in de gesloten originele verpakking bewaren, niet in direct zonlicht. Bereide oplossing kan tot 24 uur in de koelkast bewaard worden, voor toediening kan de oplossing tot maximaal 42°C worden opgewarmd.

### Aanbevolen dosering en voerinstructies:

**Voor aanvulling en ondersteuning:** Wanneer de colostrum van de merrie van onbekende of onvoldoende kwaliteit is, niet in voldoende hoeveelheid aanwezig is of niet voldoende is opgenomen door het veulen, kan de inname van colostrum ondersteund worden door Bonpard Colostrum toe te dienen.

- Meng 90 g Bonpard Colostrum (± 7 schepjes) met 100 tot 150 ml lauwwarm water (42-45°C), totdat een pasta-achtige massa ontstaat. Dien de pasta oraal toe aan het veulen met behulp van een spuit (90 ml).
- Of meng 90 g Bonpard Colostrum (± 7 schepjes) met 250 ml lauwwarm water (42-45°C) en dien het mengsel toe met behulp van een fles. Zorg ervoor dat het veulen de volledige hoeveelheid consumeert.

\*Let op: Het veulen moet eerst het beschikbare colostrum van de merrie drinken, voordat de Bonpard Colostrum wordt toegediend. Wanneer er geen colostrum van de merrie beschikbaar is, dient er gebruik gemaakt te worden van alternatieve behandelmethodes volgens veterinaire adviezen.

**Paarden en Ponys:** Bonpard Colostrum kan aan het dagelijkse rantsoen van het paard worden toegevoegd, ter ondersteuning van de weerstand.

- In periodes van verhoogde belasting voor het immuunsysteem (bijvoorbeeld tijdens intensieve training):  
Paarden: 2 maal daags 25 g (± 2 schepjes). / Ponys: 2 maal daags 12,5 g (± 1 schepje).
- Voor het behoud van een goede immuunfunctie en ter ondersteuning van de trainingsconditie:  
Paarden: 1 maal daags 25 g (± 2 schepjes). / Ponys: 1 maal daags 12,5 g (± 1 schepje).

**Samenstelling:** Colostrumpoeder (95%), Gistproducten, Dextrose.

### Analytische bestanddelen:

Ruw as:	7.1%
Ruwe celstof:	0.3%
Ruw eiwit:	56.5%
Ruw vet:	4.1%

Ten minste houdbaar tot: zie verpakking  
Batchnr.: zie verpakking  
Bonpard®, Centurionbaan 140, 3769 AV Soesterberg (NL)  
αDE NI 4 00076  
228146

# Bonpard® Colostrum

EN

## Complementary feed for foals and horses

**Pure freeze-dried bovine colostrum powder (95%) with prebiotics to support the immune system and intestinal flora of newborn foals and horses.**

**Net weight: 450 g**

**Storage:** 24 months after manufacturing date if stored under recommended storage conditions. Store in a dry place (<25°C) in the closed original packaging, away from direct sunlight. Prepared solution can be stored in the refrigerator for up to 24 hours, before administration the solution can be reheated to a maximum of 42°C.

### Recommended dosage and feeding instructions:

**For supplementation and support:** When the mare's colostrum is of unknown or insufficient quality, not available in sufficient quantity, or not adequately absorbed by the foal, the colostrum intake can be supported by administering Bonpard Colostrum.

- Mix 90 g of Bonpard Colostrum (± 7 scoops) with 100 to 150 ml of lukewarm water (42-45°C) until a paste-like consistency is formed. Administer the paste orally to the foal using a syringe (90 ml).
- Alternatively, mix 90 g of Bonpard Colostrum (± 7 scoops) with 250 ml of lukewarm water and administer it using a bottle. Ensure the foal consumes the full dose.

\*Note: The foal must first drink any available colostrum from the mare before Bonpard Colostrum is administered. If the mare's colostrum is unavailable, alternative treatment methods should be used according to veterinary advice.

**Paarden en Ponys:** Bonpard Colostrum can be added to the horse's daily feed, to support the immune system.

- During periods of increased stress on the immune system (e.g., during intensive training):  
Horses: 2 times per day 25 g (± 2 scoops). / Ponies: 2 times per day 12,5 g (± 1 scoop).
- To maintain good immune function and support training condition:  
Horses: 1 time per day 25 g (± 2 scoops). / Ponies: 1 time per day 12,5 g (± 1 scoop).

**Composition:** Colostrum powder (95%), Yeasts products, Dextrose.

### Analytical components:

Crude ash:	7.1%
Crude fibre:	0.3%
Crude protein:	56.5%
Crude fat:	4.1%

Best before: see packaging  
Batchnr.: see packaging  
Bonpard®, Centurionbaan 140, 3769 AV Soesterberg (NL)  
αDE NI 4 00076  
228146

# Bonpard® Colostrum

DE

## Ergänzungsfuttermittel für Fohlen und Pferde

**Reines gefriergetrocknetes Rinderkolostrum-Pulver (95%) mit Präbiotika zur Unterstützung des Immunsystems und der Darmflora von neugeborenen Fohlen und Pferden.**

**Netto Gewicht: 450 g**

**Lagerung:** 24 Monate nach dem Herstellungsdatum, wenn unter den empfohlenen Lagerbedingungen aufbewahrt. Trocken (<25°C) und in der geschlossenen Originalverpackung bewahren, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die zubereitete Lösung kann bis zu 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahrt werden, vor der Verabreichung kann die Lösung auf maximal 42°C erwärmt werden.

### Empfohlene Dosierung und Fütterungsschema:

**Für Ergänzung und Unterstützung:** Wenn das Kolostrum der Stute unbekannter oder unzureichender Qualität ist, nicht in ausreichender Menge vorhanden oder vom Fohlen nicht ausreichend aufgenommen wird, kann die Kolostrum-aufnahme durch die Gabe von Bonpard Colostrum unterstützt werden.

- Mischen Sie 90 g Bonpard Colostrum ( $\pm$  7 Messlöffel) mit 100 bis 150 ml lauwarmem Wasser (42-45°C), bis eine pastartige Konsistenz entsteht. Verabreichen Sie die Paste dem Fohlen oral mit einer Spritze (90 ml).
- Alternativ können Sie 90 g Bonpard Colostrum ( $\pm$  7 Messlöffel) mit 250 ml lauwarmem Wasser mischen und die Mischung mit einer Flasche verabreichen. Stellen Sie sicher, dass das Fohlen die gesamte Menge aufnimmt.

\*Hinweis: Das Fohlen muss zunächst das verfügbare Kolostrum von der Stute trinken, bevor Bonpard Kolostrum verabreicht wird. Wenn das Kolostrum der Stute nicht verfügbar ist, sollten alternative Behandlungsmethoden gemäß den veterinärmedizinischen Empfehlungen angewendet werden.

**Pferde und Ponys:** Bonpard Kolostrum kann dem täglichen Futter des Pferdes hinzugefügt werden, um das Immunsystem zu unterstützen.

- In Phasen erhöhter Belastung des Immunsystems (z. B. während intensiven Trainings):  
Pferde: 2-mal täglich 25 g ( $\pm$  2 Messlöffel). / Ponys: 2-mal täglich 12,5 g ( $\pm$  1 Messlöffel).
- Zur Erhaltung einer guten Immunfunktion und zur Unterstützung der Trainingsverfassung:  
Pferde: 1-mal täglich 25 g ( $\pm$  2 Messlöffel). / Ponys: 1-mal täglich 12,5 g ( $\pm$  1 Messlöffel).

**Zusammensetzung:** Kolostrumpulver (95%), Hefenerzeugnisse, Traubenzucker.

### Analytische bestandteile:

Rohasche:	7.1%
Rohfaser:	0.3%
Rohprotein:	56.5%
Rohfett:	4.1%

Am besten vor: Siehe Verpackung  
Batchnr.: siehe Verpackung  
Bonpard®, Centurionbaan 140, 3769 AV Soesterberg (NL)  
dDE NI 4 00076  
228146

# Bonpard® Colostrum

FR

## Aliment complémentaire pour poulains et chevaux

**Poudre de colostrum bovin lyophilisé pur (95%) avec des prébiotiques pour soutenir le système immunitaire et la flore intestinale des poulains nouveau-nés et des chevaux.**

**Poids net : 450 g**

**Stockage :** 24 mois après la date de fabrication, si stocké dans des conditions de stockage recommandées. A conserver au sec (<25°C) et dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière directe du soleil. La solution préparée peut être conservée au réfrigérateur pendant 24 heures maximum. Avant l'administration, la solution peut être réchauffée à une température maximale de 42°C.

### Instructions de dosage et d'alimentation :

**Pour supplémentation et soutien :** Lorsque le colostrum de la jument est de qualité inconnue ou insuffisante, qu'il n'est pas disponible en quantité suffisante ou qu'il n'est pas correctement absorbé par le poulain, l'apport en colostrum peut être soutenu en administrant Bonpard Colostrum.

- Mélangez 90 g de Bonpard Colostrum ( $\pm$  7 doses) avec 100 à 150 ml d'eau tiède (42-45°C) jusqu'à obtenir une consistance pâteuse. Administrer la pâte par voie orale au poulain à l'aide d'une seringue (90 ml).
- Alternativement, mélangez 90 g de Bonpard Colostrum ( $\pm$  7 doses) avec 250 ml d'eau tiède (42-45°C) et d'administrer le mélange à l'aide d'un biberon. Veillez à ce que le poulain consomme la totalité de la quantité.

\*Note : Le poulain doit d'abord boire le colostrum disponible de la jument avant que le Bonpard Colostrum ne soit administré. Si le colostrum de la jument est indisponible, des méthodes de traitement alternatives doivent être suivies selon les conseils vétérinaires.

**Chevaux et Ponys :** Bonpard Colostrum peut être ajouté à la ration quotidienne du cheval pour soutenir son système immunitaire.

- Pendant les périodes de stress accru pour le système immunitaire (par exemple, lors d'un entraînement intensif) :  
Chevaux : 2 fois par jour 25 g ( $\pm$  2 mesures). / Ponys : 2 fois par jour 12,5 g ( $\pm$  1 mesure).
- Pour maintenir une bonne fonction immunitaire et soutenir la condition d'entraînement :  
Chevaux : 1 fois par jour 25 g ( $\pm$  2 mesures). / Ponys : 1 fois par jour 12,5 g ( $\pm$  1 mesure).

**Composition:** Poudre de colostrum (95%), Produits de levures, Dextrose.

### Constituants analytiques :

Cendres brutes :	7.1%
Cellulose brute :	0.3%
Protéine brute :	56.5%
Grasses brutes :	4.1%

A consommer de préférence avant : voir les emballages  
Numéro de lot. : voir les emballages  
Bonpard®, Centurionbaan 140, 3769 AV Soesterberg (NL)  
dDE NI 4 00076  
228146